

LEKARSKIE BADANIE KWALIFIKACYJNE ORAZ SZCZEPIENIA OCHRONNE U DZIECI DO 6 R.Ż WYKONUJE SIĘ W OBECNOŚCI OPIEKUNÓW PRAWNYCH



W celu **zminimalizowania bólu** przed szczepieniem można w miejscu wkłucia na godzinę przed szczepieniem założyć **plaster Emla** (lidokaina i przylokaina)

Miejsce wstrzyknięcia: **przednio-boczna część uda**

Do 3 m.ż. można okleić jedno udo, **po 3 m.ż.** można znieczulić obie nogi

Pomocne linki:

<http://szczepienia.pzh.gov.pl/>

<https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/>

1 r.ż. szczepienia obowiązkowe - finansowane przez Min. Zdrowia dla dzieci:

| SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE BEZPŁATNE | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WIEK | WZW B | DTP | H. INFLUEN- ZAE | POLIO | PNEUMOKOKI | ROTAWIRUSY (doustnie) | ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA |
| ok. 2 mies. życia | II dawka | I dawka | I dawka | X | I dawka | I dawka | X |
| ok. 4 mies. życia | X | II dawka | II dawka | I dawka | II dawka | II dawka | X |
| ok. 6 mies. życia | X | III dawka | III dawka | II dawka | X | III dawka | X |
| ok. 7 mies. życia | III dawka | X | X | X | X | X | X |
| ok. 13 mies. życia | X | X | X | X | III dawka | X | I dawka |
| ok. 16 mies. życia | X | IV dawka | IV dawka | III dawka | X | X | X |

1 r.ż. szczepienia obowiązkowe (skojarzone) – płatne:

- **Infanrix Hexa** (6w1- wzw B, błonica, tężec, krztusiec, h.influenzae, polio)
3 dawki + 1dawka w 2r.ż. (16-18mż.) - **215 zł**
albo
- **Hexacima (Hexacim)** (6w1- wzw B, błonica, tężec, krztusiec, h.influenzae, polio)
3 dawki + 1dawka w 2r.ż. (16-18mż.) **180 zł**

W przypadku szczepienia preparatami skojarzonymi (Infanrix Hexa lub Hexacima) dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień otrzymuje **bezpłatnie** szczepienie **p/pneumokokom** (Synflorix szczepionka 10-walentna) oraz **p/rotawirusom** (Rotateq szczepionka doustna)

!!Dzieci urodzone przed ukończeniem 37t.c. lub z masą urodzeniową poniżej 2500g lub ze wskazań lekarskich określonych w Rozporządzeniu otrzymują bezpłatnie szczepienie **p/pneumokokom preparatem **Prevenar** oraz bezpłatną **szczipionkę skojarzoną 5w1 (Pentaxim – błonica, tężec, krztusiec, h. Influenzae, polio)****

Dzieci urodzone w 2021r. podlegają obowiązkowemu, darmowemu szczepieniu przeciw rotawirusom (Rotateq) w cyklu 3-dawkowym w 2-4-6 m.ż. (cykl musi być ukończony do 32 tyg. życia)

Szczepienia zalecane (płatne)

ROTAWIRUSY (Rotarix) – II dawki (cykl szczepień musi być ukończony do 24 tyg.ż.) 355zł

<http://www.powstrzymajrotawirusy.pl/>

PNEUMOKOKI (Prevenar13 szczepionka 13-walentna) – 280zł

cykle szczepienia :

- rozpoczęte do 6 m.ż. - 3 dawki + IV dawka 11-15mż.
- 7-12 m.ż.- 2 dawki + III dawka w 2r.ż. (16-18mż.)
- 12-24 m.ż. - 2 dawki
- powyżej 24 m.ż – 1 dawka

<http://www.parasoldlaczycia.org/>

MENINGOKOKI

Bexero (meningokoki z grupy B) 380 zł

- rozpoczęte 2-6 ukończony m.ż -2 dawki co 2 miesiące + III dawka między 12-15m.ż. (co najmniej 6 mies. od II dawki).
- ukończony 6-12 m.ż. - 2 dawki co 2 miesiące + III dawka w 2 r. ż. (co najmniej 2 mies. od II dawki).
- 12-24 m.ż. - 2 dawki co 2 miesiące + III dawka po 12-23 mies.po II dawce.
- powyżej 2 r. ż. - 2 dawki w odstępie co najmniej 1 miesiąca.

Nimenrix (meningokoki z grupy ACWY) 195 zł

- rozpoczęte między 6t.ż -poniżej 6 m. ż - 2 dawki co 2mies. + dawka przypominająca w 12 m.ż
- rozpoczęte powyżej 6m.ż – 1 dawka + 1 dawka przypominająca w wieku 12mies. (z zachowaniem min. 2mies.odstępu)
- po ukończeniu 1 r.ż. - 1 dawka

<http://www.meningokoki.pl/>

OSPA WIETRZNA (szczepionka Varilrix) 250 zł

| Grupa wiekowa | Minimalny odstęp między 1 a 2 dawką |
|--|-------------------------------------|
| Niemowlęta od ukończenia 9 m.ż. do 11 m.ż (włącznie) | 3 miesiące |
| Dzieci od ukończenia 12 m.ż, młodzież i dorośli | 6 tygodni |

<http://www.ospawietrzna.pl/>

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (Esme Immun Junior powyżej 1r.ż. do 15r.ż.) 120zł

2 dawki w odstępie 1-3mies.; trzecia po 5-12 mies. od drugiej; dawki przypominające po 3 i 5 latach

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (Havrix 720 Junior – powyżej 1r.ż – do 18r.ż.) 130zł

2 dawki w odstępie najlepiej 6-12 mies. (max. do 5 lat)

Szczepienie przeciw chorobom wywoływanych przez wirusa HPV (Gardasil 9) 500 zł

- Pacjenci w wieku od 9 do 14 lat – 2 dawki z odstępiem 5-13 miesięcy
- Pacjenci w wieku 15 lat i starsi - 3 dawki (0, 2, 6 miesięcy)

GRYPA (szczepionki rejestrowane co rok - zalecane powyżej 6m.ż.)

Aktualne szczepy do produkcji szczepionek są co rok określane przez Światową Organizację Zdrowia

Przeciw COVID-19

- dzieci od 5 do 11 lat **Comirnaty 10 µg** (2 dawki w odstępie min. 21 dni)
- dzieci od 12 lat **Comirnaty 30 µg** (2 dawki w odstępie min. 21 dni)
-

Szczepienia zalecane kobietom w ciąży:

- ✓ p/grypie
- ✓ p/wirusowemu zapaleniu wątroby
- ✓ dTap (p/błonicy, tężcowi i krztuścowi) – 27-36tc. (optymalnie od ukończenia 27 do 32 t.c.)
- ✓ - p/covid

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

**Punkcie Szczepień Przychodnia Zabobrze Sp. z o.o. , ul. Ogińskiego 1 B w godz. 13-14,
tel. 75-88-90-170**